



CLINIQUE VETERINAIRE DES SOURCES

La dysplasie de la hanche

Définition

La dysplasie de la hanche est une affection héréditaire, non congénitale, caractérisée par un défaut de coaptation des surfaces articulaires (tête fémorale-acetabulum). Cette affection concerne de nombreuses races, mais ce sont, généralement, les chiens de grande race qui sont les plus touchés.


Les conséquences d'une telle affection peuvent être graves et irréversibles. Cependant, un diagnostic précoce de dysplasie permet d'offrir au chien la possibilité d'un traitement adapté.

Ce diagnostic n'est réalisable qu'au moyen d'une radiographie des hanches. Nous conseillons un **dépistage de dysplasie entre 6 et 8 mois** chez les chiens de race concernés.

Chez les animaux prédisposés, il est possible d'effectuer un dépistage dès l'âge de 14 semaines par technique de distraction (distracteur de Vezzoni). Certaines compagnies d'assurance santé pour chiens et chats prennent en charge les dysplasies coxo-fémorales, moyennant ce dépistage précoce.



Conséquences possibles de la dysplasie



Prévention

Il est donc nécessaire chez les chiens de race prédisposés de :

- Se limiter, durant la croissance, à une alimentation industrielle pour chiot en croissance sans apporter de complément calcique ;
- Eviter tout excès de poids ;
- Permettre un exercice ni trop intense, ni trop faible pour développer la masse musculaire sans augmenter les contraintes sur l'articulation ;
- Passer une radiographie de dépistage de dysplasie afin de savoir si un traitement chirurgical sera nécessaire et possible.