CLINIQUE VETERINAIRE DES SOURCES

Suivi de gestation de votre chienne

J-10
J 0

- **Début des chaleurs**

Gestation de 57 à 70 jours

- **Oestrus :**
  - Durée : de 3 à 10 jours
  - Période où doit se faire la saillie (3 saillies à 2 jours d'intervalle)
  - Diagnostic de certitude de l'oestrus par frottis et/ou dosage de la progestérone
  - Si problème de saillie, possibilité d'*insémination artificielle*

J 21

- **Diagnostic précoce de gestation par échographie**

J 35

- **Début d'une prise de poids importante**
- Ne pas augmenter la ration alimentaire pendant la gestation

J 50

- **Radiographie de contrôle**
  - Comptage du nombre de chiots
  - Prévision d'éventuels problèmes de mise-bas
- Vermifugation
- Début des contractions
- Montée de lait
- **Prise de température 2 fois/jour**

J 55

J 57

Mise bas

- Chute possible de la température de 1°C, 24h avant la mise bas
- **Si pas de mise bas dans les 24h : VETERINAIRE !**
- S'il existe un doute sur l'imminence de la mise bas : prise de sang
- Apparition de *glaires au niveau de la vulve : travail imminent*
- Optimisation de l'accouchement: Aglepristone® 20h → césarienne
- Préparer une zone de mise bas au calme
- Un chiot toutes les 1/2 heures (max. 4h), un placenta après chaque chiot
- Vérifier que les chiots **tètent dans les 2 heures** suivant la naissance et que la chienne a du lait
- **Visite de contrôle 24h** après la mise bas
- **Désinfecter les cordons** ombilicaux à la Vétédine® 2 fois/jour

J 59

J 70

Arrivée des chiots

Allaitement

- **Antibiothérapie maternelle** - T° 25°C dans la pièce - Peser les chiots (courbe de croissance)
- Augmentation progressive de la ration alimentaire chez la mère : préférer une ***alimentation pour chiot pendant la lactation*** à complémenter en calcium jusqu'au sevrage
- **Vermifugation de la mère et des chiots**
- Sevrage progressif des chiots

J0

J+7

J+15

J+40